ヾスタイム♪に潜む危険 でゆ った IJ





全体の約五割が冬季に発生しているという報告があります。ありますね。一方、入浴中の事故は年間約一万件以上もあり、寒い季節、お風呂や温泉はリラックスできる癒しの時間でも これは入浴前後で血圧が急激に変化しヒートショックと呼ば れる状態になることが原因の一つとして挙げられています。 お風呂や温泉はリラックスできる癒しの時間でも

そこで今回は ヒートショック』 に関するお話です。

\bigstar ١ 1 シ 3 ツ ク は

変化するために起こる健康障害のことで、 どを引き起こす原因となります ヒートショックとは、 @健康障害のことで、脳卒中や心筋梗塞な||急激な「温度差」によって血圧が大きく|

寒い季節の入浴時は、 血圧が次のように変動します。

- 2 1 寒い浴室へ入ると、さらに血圧が上昇(タ) 寒い脱衣所で衣服を脱ぐと血管が収縮し、血圧が上昇(少)
- 3 浴槽に入り肩まで湯につかると心臓へ水圧がかかり、さら に血圧が上昇(ダ)
- 4 熱めの湯に入ると交感神経が緊張し、 血圧が急激に上昇 J.
- (5) 体が温まると血管が拡張し、 血圧が急激に下降()
- 6 浴槽から上がると水圧がなくなり、血圧がさらに下降(v)

このように温度に影響され、短時間で血圧が大きく変動して な場所であることを認識しておくことが大切です。 いることがわかります。寒い季節、 浴室はとても注意が必要

特にヒートショックの影響を受けやすい人は次の通りです。

- 六五歳以上の高齢者
- 糖尿病、 患がある 高血圧、 脂質異常症など動脈硬化の原因となる疾 3
- 飲酒後に入浴する
- 四二度以上の熱い湯に一〇分以上浸かる

★できていますか?入浴時のヒートショック対策★

起きています。 いますが、実は持病がなく普段元気な人でも死亡する事故が 入浴中の事故は高齢者が多いということは既にご承知かと思

必要があります 消費者庁が五五歳以上の男女を対象に行った調査(平成二七 較的若い年齢の方も、 識を失ってヒヤリとしたことがあると回答していました。 年一二月)によると、 約一割の方が入浴中にのぼせたり、 ヒートショックによる危険を認識するしたことがあると回答していました。比約一割の方が入浴中にのぼせたり、意 4

ている」と回答した人は三二%、「暖房機で浴室を暖めてい 内に上がる」を守っている人は四二%にとどまっています。 全な入浴方法として推奨されている「四一度以下で一〇分以 る」と回答した人は二二%と少ない状況でした。そして、安 また、寒い日に「シャワー又は浴槽の蓋を開けて浴室を暖め

★ 予 防 ਰ る た め ഗ ポ 1 ント★

入浴中の事故を防ぐために、 を呼びかけています。 消費者庁は次の五点について注意

1 入浴前に脱衣所や浴室を暖める

かき混ぜて蒸気を立て、蓋を外しておくと室温が上昇しま 立てたり、湯沸かし器の場合は、浴槽の湯が沸いた段階で また、浴槽内に湯を入れる際はシャワーで給湯して蒸気を いよう、暖房器具などで温めておきましょう。 鳥肌が立つほど寒い脱衣所や浴室から湯に浸かることがな

2

合は体温が上昇する恐れがあるので、注意が必要です。 湯に浸かる時間は『一〇分以内』、浴槽の湯は四一度以下が することをお勧めします。 お風呂上りのポカポカ感を実感したい方は、 胸の下辺りまでにしましょう。半身浴も長時間の入浴の場 目安です。また、浸かる範囲は心臓への負担を避けるため、 と、体温が上昇し熱中症になる恐れがあります。 熱いお湯に長時間浸かりのぼせてしまい意識障害が起こる 入浴剤を利用 ショック予報」

浴槽から急に立ち上がらない

※今回の記事は次の資料を参考・引用して作成いたしました。

(http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

思いますが、それは「のぼせた」だけでなく が関係している可能性もあります 浴槽から上がるとき、 立ちくらみを経験した方も多いかと 血圧の変化

> を起こしやすくなります。 脳に行く血液が減って貧血状態に陥り、 くなり圧迫されていた血管が一気に拡張します。そのため、 浴槽から急に立ち上がるとそれまでかかっていた水圧がな 一過性の意識障害

浴槽から出る時は、手すりや浴槽のへりを使って体を支え ゆっくり立ち上がるようにしましょう。

アルコールが抜けるまで、また、食後すぐの入浴は控える の負担が大きいため、アルコールが抜けるまでは入浴しな 飲酒直後の入浴は脱水症状や血圧の急激な上昇で、身体へ

いようにしましょう。

失神しやすくなる場合があるので、食後すぐの入浴も避け 後、気温が低下する早朝や深夜の入浴にも注意が必要です。 た方が良いです。さらに、体調が悪い時や睡眠薬等の服用 高齢者では、食後に血圧が下がりすぎる食後低血圧により

(5) 入浴する前に同居者に

「お風呂に入ってくる」と声をかける 入浴中に体調の異変があった場合は、早期に対応することが 大切ですが、入浴前に同居者に一声掛けている人は少ない状

最 後 に

らうなど、安心できる環境で入浴をしましょう。

況です。いつもより入浴時間が長い場合は様子を見に来ても

ヒートショック対策はとても単純

高齢者だけでなく、子供や若い方も要注意。 かがでしょうか。【S】 せなバスタイムを過ごせるよう、家族や離れて 暮らすご高齢のご家族も含めて、 を防ぐための対策について検討してみてはい 『寒暖差を無くすこと』です。 入浴中の事故 幸

4

こちらも参考にママ

日本気象協会の天気予報専門メディア「ヒー https://tenki.jp/heatshock/

・ルマガジンにて発信しています。

毎月タイムリーでホットな情報を無料の

健康づく

りかわら版